



Pueblo Radiology Medical Group

## **EXTRAVIACION**

Instrucciones para el paciente después de este examen

Durante el transcurso de su examinación, se le inyecta contraste (“yodo”) y se regó fuera de sus venas alrededor de sus tejidos de donde fue inyectado el contraste. A esto se le llama “extraviación”. Se le notará hinchazón y amoratado en la área donde fue inyectado.

Usualmente, no hay efectos secundarios a causa de esto es muy rara la vez que ocurren problemas. Si es que pasan estos problemas le pedimos que haga lo siguiente:

- 1) Por favor de mantener el área afectada arriba del nivel de su corazón por 12 horas. Por ejemplo, si la extraviación fue en su brazo, recuestese y mantenga su brazo en una almohada arriba del nivel de su corazón.
- 2) Por favor de aplicar fomentos tibios (no calientes) en el área afectada, por lo menos una vez por hora por 3 horas.
- 3) Por favor de llamar a nuestro consultorio si experimenta lo siguiente:
  - mucho dolor o hinchazón después de 2-4 horas
  - cualquier cambio o sensación en la área afectada
  - ulceración de la piel (“llaga”)
  - ampolla en el área afectada

Si tiene dificultad de comunicarse con nuestro consultorio o su doctor familiar, por favor de ir a la sala de emergencia más cercana a usted.

- 4) Por favor de regresar a nuestro consultorio al próximo día, o llame y deje el número de teléfono a donde nosotros podamos comunicarnos con usted y para saber cómo se encuentra de salud después de su examen.